

Infoclim 34

Bulletin climatologique de l'Hérault N°318 – Janvier 2026

Mois relativement humide, aux précipitations très excédentaires.
Températures de saison à extrêmement douces, exceptionnellement assez froides à très froides.
Vent variable avec rafales.

Du 1^{er} au 7 : Ciel clair, assez froid à très froid (gelées), flux Nord-Est et Nord-Ouest dominant

Temps clair sans pluie. Les températures moyennes sont assez froides à très froides avec vague de froid pour début janvier, 7 jours de gelée (forte gelée le 6 et 7 jusqu'à -6°C par rapport aux normales de saison). Vent faible, Nord-Est et Nord-Ouest dominant.

Du 8 au 12 : Ciel clair et nuageux, doux à extrêmement doux, flux Nord-Ouest et Ouest dominant avec rafales

Ciel clair et nuageux, couvert avec légères averses le 12. Les températures sont douces à extrêmement douces, jusqu'à +5 le 12 par rapport aux normales de saison. Vent variable, Nord-Ouest et Ouest dominant avec des rafales du 8 au 10 (75 km/h le 9).

Du 13 au 18 : Ciel couvert, orages, très doux à extrêmement doux, flux variable avec rafales

Ciel couvert avec pluies orageuses le 17 et 18. Les températures très douces à extrêmement douces, jusqu'à +4 le 16 par rapport aux normales de saison. Vent variable Sud-Est et Est dominant, avec des rafales du 15 au 18 (60 km/h le 16 et 18).


Du 19 au 24 : ciel couvert, orage, de saison à extrêmement doux, flux variable Nord-Est dominant avec rafales

Ciel couvert, pluies faibles à localement soutenues. Les températures de saison à extrêmement douces, jusqu'à +4 le 20 par rapport aux normales de saison. Vent variable Nord-Est dominant, avec rafales du 21 au 24 (55 km/h).

Du 25 au 31 : Ciel clair et couvert avec précipitations, de saison à froid, flux variable faible

Ciel clair et couvert avec faibles précipitations (jusqu'à 13 mm le 27). Les températures de saison à froides, le 30 et 31 jusqu'à -2 par rapport aux normales de saison. Vent variable faible, Nord-Ouest et Ouest dominant.

➤ Précipitations



Les cumuls de précipitations mesurés dans le tableau des précipitations de janvier (page suivante) présentent un excédent très fort.

Ce mois de janvier est globalement très humide, mais l'intensité des précipitations est hétérogène, avec écarts à la moyenne (2011-2020) compris entre **+146%** à Entre-Vignes et **+707%** à Puisserguier (voir carte de l'écart pluviométrique à la moyenne, page suivante).

Le nombre de jours de précipitations compris entre 7 et 21 jours (7 et 8 jours dans 2 stations ; 9 jours dans 4 stations ; 10 jours dans 5 stations ; 11 jours dans 3 stations ; 12 jours dans 4 stations, 13 jours dans 7 stations ; 14 jours dans 1 station ; 15 dans 3 stations ; 16 et 17 jours dans 2 stations ; 18 jours dans 1 station ; 19 et 20 jours dans 2 stations et 21 jours dans 4 stations).


Les précipitations mensuelles oscillent entre **103,4mm** à

Sète et **464,2mm** à Castanet le Haut. La 1^{er} décade est humide, elle est la moins pluvieuse, la 2^e est très humide, elle concentre les précipitations les plus importantes du mois et la 3^e est assez humide et arrosée. Les sept stations de la Zone de Piémont enregistrent les cumuls mensuels les plus importants du département (de **266mm** à **464mm**).

Ce mois de janvier 2026 est différent de celui de 2025 qui était fortement déficitaire à très fortement excédentaire avec écarts à la moyenne (2011-2020) compris entre **63%** à **+155%** et où les cumuls de précipitations variaient de **21mm** à **151mm**.

Comme nous pouvons le voir dans le graphique ci-dessus, les précipitations de ce mois de janvier 2026 sont largement au-dessus de la moyenne d'un mois de janvier.

Variation pluviométrique par rapport à la moyenne de référence - Janvier 2026



Indicateurs mensuels et cumuls de précipitation décadaires en mm par station et par unité agroclimatique*

janv. 2026	Décade 1	Décade 2	Décade 3	Total mois	Variation / moyenne**	Nb jours pluie***
Zone de Piémont						
<i>Cambon-et-Salvergues, Mas Belbonne* (alt. 897 m)</i>	36,2	254,3	124,7	415,2	238%	21
<i>Castanet le Haut (alt. 420 m)</i>	36,1	305,4	122,7	464,2	258%	21
<i>La Vacquerie, Terrain communal (alt. 614 m)</i>	14,6	194,5	96,8	305,9	236%	15
<i>Le Caylar, Roquelongue (alt. 728 m)</i>	24,7	165,4	76,4	266,5	227%	20
<i>Les Plans, la Quille* (alt. 819 m)</i>	27,6	217,6	70,8	316	258%	20
<i>Lunas, La Chapelle* (alt. 280 m)</i>	16,9	205,5	63,2	285,6	175%	21
<i>Saint-Maurice-de-Navacelles, Bourg* (alt. 574 m)</i>	12,2	220,8	119,1	352,1	235%	19
Vallée de l'Orb-Lodévois						
<i>Bédarieux, aérodrome (alt. 366 m)</i>	12	179,8	61,4	253,2	314%	18
<i>Brenas (alt. m)</i>	9	208,5	93	310,5	263%	19
<i>Lodève, Versailles Premierlet* (alt. 185 m)</i>	24,7	161,9	57,6	244,2	240%	17
<i>Olargues, champ des Horts (alt. 174 m)</i>	34	218	90	342	362%	21

janv. 2026	Décade 1	Décade 2	Décade 3	Total mois	Variation / moyenne**	Nb jours pluie***
Hauts Côteaux						
<i>Cabrières (alt. m)</i>	2,5	148,5	97	248	412%	13
<i>Clermont l'Herault, Salagou (alt. 149 m)</i>	4,5	127,5	62,5	194,5	202%	12
<i>Laurens (alt. 186 m)</i>	2	184	81,5	267,5	524%	15
<i>Prades sur Vernazobre, La Croix Sainte Eulalie (alt. 107 m)</i>	8,5	226	63,5	298	608%	13
<i>Roquebrun (alt. 110 m)</i>	8	151	64,5	223,5	446%	14
<i>Soumont, Les Caoumelles (alt. 250 m)</i>	10,8	134	57,4	202,2	219%	16
<i>Vailhan, Bourg* (alt. 153 m)</i>	0,4	162,8	80,6	243,8	377%	9
Minervois						
<i>La Livinière, Ste Eulalie (alt. 201 m)</i>	29,5	204,5	59	293	403%	17
<i>Saint-Jean-de-Minervois, les Causses Bas (alt. 256 m)</i>	10,4	252,5	63,4	326,3	495%	16
<i>Siran, Najac* (alt. 138 m)</i>	21,6	184,9	62,1	268,6	328%	15
Biterrois						
<i>Béziers, la Courtade* (alt. 28 m)</i>	3	129,2	52,3	184,5	487%	11
<i>Béziers-Bayssan, Domaine Bayssan (alt. 37 m)</i>	2,5	135	69,5	207	570%	10
<i>Murviel-les-béziers sa, château de Coujan* (alt. 137 m)</i>	3,8	127,1	61	191,9	466%	13
<i>Portiragnes, Beziers-Vias aéroport* (alt. 16 m)</i>	0,6	110,7	57,3	168,6	422%	7
<i>Puisserguier, domaine de la Guiraud (alt. 70 m)</i>	3,5	197	75,5	276	707%	12
Basse Vallée de l'Hérault						
<i>Marseillan, Domaine de Vassal (alt. 3 m)</i>	0	95	57	152	367%	10
<i>Pézenas-Tourbes, Lycée Bonne Terre* (alt. 40 m)</i>	0,4	118,5	60,4	179,3	372%	7
<i>Roujan (alt. 77 m)</i>	1	138,5	65,5	205	418%	10
<i>Servian, le puech Arnaud (alt. 50 m)</i>	1	113	67	181	446%	9
<i>Villeveyrac (alt. 31 m)</i>	0	104,5	67,5	172	342%	9
Moyenne Vallée de l'Hérault						
<i>Plaissan (alt. m)</i>	0,5	93	65,5	159	279%	13
<i>Saint-André-de-Sangonis, Bourg* (alt. 88 m)</i>	3,6	95	60,4	159	254%	10
<i>Saint-Jean-de-Fos (alt. 69 m)</i>	4,5	122	76,5	203	343%	12
Montpelliérans						
<i>Cournonsec - Fabrègues (alt. m)</i>	1,5	102	79,5	183	237%	13
<i>Entre-vignes, bois de l'Hôpital (alt. 63 m)</i>	0,5	45,5	70,5	116,5	146%	11
<i>Frontignan (alt. 31 m)</i>	0	84,5	91,5	176	302%	8
<i>Marsillargues, mas de Carrière c.e.h.m (alt. 2 m)</i>	/	/	/		/	
<i>Mauguio, Montpellier aéroport* (alt. 2 m)</i>	0,2	62,7	77,9	140,8	185%	10
<i>Montarnaud, Le Bois d'Arnaud* (alt. 142 m)</i>	1,8	110,7	79,3	191,8	174%	13
<i>Montpellier, Château d'Ô (alt. 63 m)</i>	0,5	98	95,5	194	254%	13
<i>Montpellier, Supagro (alt. 43 m)</i>	0,5	81,5	81,5	163,5	199%	12
<i>Saint-Drézéry (alt. 75 m)</i>	0,5	76	91,5	168	160%	11
<i>Sète, Sémaphore* (alt. 92 m)</i>	0	55,1	48,3	103,4	168%	8
<i>Villeneuve-les-Maguelonne, domaine du Chapitre (alt. 2 m)</i>	0	96,5	85	181,5	307%	9


Températures

Les températures moyennes sont globalement de saison à assez froides, exceptionnellement froides à très froides (le 1^{er} janvier, le thermomètre est descendu jusqu'à $-10,8^{\circ}\text{C}$ à la station Le Caylar). Elles présentent un écart à la moyenne (2011-2020) compris entre -1°C et $+0,9^{\circ}\text{C}$ (voir carte de l'écart thermique à la moyenne). La 1^{re} décade est froide à extrêmement froide avec des gelées, la 2^e de saison à exceptionnellement douce et la 3^e varie

de saison à froide.

Ce mois de janvier 2026 est moyennement différent de celui de 2025, aux températures globalement de saison à assez douces et très localement douces, aux écarts à la moyenne (2011-2020) compris entre $+0,2^{\circ}\text{C}$ et $+1^{\circ}\text{C}$ (voir carte de l'écart thermique à la moyenne).

Ecart de température par rapport à la moyenne de référence - Janvier 2026



Indicateurs mensuels et températures en °C par station et par unité agroclimatique*

janv. 2026	T° Min moy	T° moy	T° Max moy	T° Min absol e	date T° Min absol ue	T° Max absol ue	date T° Max absolue	Ecart / moyenne **
Zone de Piémont								
Cambon-et-Salvergues, Mas Belbonne* (alt. 897 m)	-0,5	2,3	5,1	-8,9	5-janv.	9	30-janv.	-0,7°C
Castanet le Haut (alt. 420 m)	2,7	5,1	7,6	-4,9	1-janv.	11,3	16-janv.	-0,4°C
La Vacquerie, Terrain communal (alt. 614 m)	0,5	3,7	6,9	-8,6	7-janv.	10,3	30-janv.	-0,8°C
Le Caylar, Roquelongue (alt. 728 m)	-0,2	2,7	5,7	-10,6	1-janv.	8,9	30-janv.	-0,5°C
Les Plans, la Quille* (alt. 819 m)	0,2	2,4	4,6	-9,9	6-janv.	8,2	30-janv.	-0,3°C
Lunas, La Chapelle* (alt. 280 m)	3,3	6,5	9,6	-5,9	1-janv.	13,4	30-janv.	nc***
Saint-Maurice-de-Navacelles, Bourg* (alt. 574 m)	0,8	4,1	7,4	-8,2	1-janv.	11,8	29-janv.	nc***
Vallée de l'Orb-Lodévois								
Bédarieux, aérodrome (alt. 366 m)	2,7	5,7	8,7	-5,4	1-janv.	12,9	8-janv.	-0,6°C
Brenas (alt. m)	3,2	5,7	8,1	-4,8	5-janv.	12,8	8-janv.	nc***
Lodève, Versailles Premierlet* (alt. 185 m)	3,1	6,7	10,3	-4,8	1-janv.	14,5	30-janv.	nc***
Olargues, champ des Horts (alt. 174 m)	3,4	6,9	10,5	-4,3	1-janv.	14,6	30-janv.	-0,6°C
Hauts Côteaux								
Cabrières (alt. m)	3,6	7,5	11,4	-5,2	1-janv.	17,6	8-janv.	-0,8°C
Clermont l'Herault, Salagou (alt. 149 m)	4,2	7,3	10,4	-2,7	7-janv.	14,5	8-janv.	-0,8°C
Laurens (alt. 186 m)	4,1	7,3	10,4	-2,6	7-janv.	15,2	8-janv.	-0,6°C
Prades sur Vernazobre, La Croix Sainte Eulalie (alt. 107 m)	3,6	7,5	11,4	-4,7	1-janv.	15,7	30-janv.	-0,3°C
Roquebrun (alt. 110 m)	4,2	7,9	11,6	-5,1	4-janv.	16,6	30-janv.	-0,4°C
Soumont, Les Caoumelles (alt. 250 m)	4,1	7,1	10	-3,4	7-janv.	14,8	29-janv.	-0,8°C
Vailhan, Bourg* (alt. 153 m)	4	7,4	10,8	-3,9	11-janv.	15,6	8-janv.	nc***
Minervois								
La Livinière, Ste Eulalie (alt. 201 m)	3,4	7,3	11,2	-6	6-janv.	17,3	30-janv.	-0,1°C
Saint-Jean-de-Minervois, les Causses Bas (alt. 256 m)	3,8	7,2	10,6	-4	1-janv.	15,8	30-janv.	-0,3°C
Siran, Najac* (alt. 138 m)	4,3	7,5	10,7	-4,7	6-janv.	15,2	30-janv.	-0,4°C
Biterrois								
Béziers, la Courtade* (alt. 28 m)	3,9	7,9	11,9	-5,5	1-janv.	16,3	30-janv.	-0,4°C
Béziers-Bayssan, Domaine Bayssan (alt. 37 m)	4	7,8	11,5	-3,1	1-janv.	15,6	30-janv.	-0,3°C
Murviel-les-béziers sa, château de Coujan* (alt. 137 m)	4,1	7,6	11,2	-3,9	7-janv.	15,7	30-janv.	-0,3°C
Portiragnes, Beziers-Vias aéroport* (alt. 16 m)	4	8	12	-4	7-janv.	16,5	30-janv.	-0,1°C
Puisserguier, domaine de la Guirauda (alt. 70 m)	3,9	7,7	11,6	-4,4	1-janv.	16	30-janv.	-0,1°C
Basse Vallée de l'Hérault								
Marseillan, Domaine de Vassal (alt. 3 m)	5,5	8,7	12	-2,8	1-janv.	16,7	8-janv.	0,1°C
Pézenas-Tourbes, Lycée Bonne Terre* (alt. 40 m)	5,2	9	12,9	-3,4	1-janv.	19,4	8-janv.	0,9°C
Roujan (alt. 77 m)	3,4	7	10,5	-5,3	1-janv.	16,3	8-janv.	-0,3°C
Servian, le puech Arnaud (alt. 50 m)	3,8	7,8	11,7	-5,7	7-janv.	17,3	8-janv.	-0,4°C
Villeveyrac (alt. 31 m)	4,1	7,9	11,8	-5,6	1-janv.	17,7	8-janv.	-0,2°C

janv. 2026	T° Min moy	T° moy	T° Max moy	T° Min abso lue	date T° Min absol ue	T° Max abso lue	date T° Max absolue	Ecart / moyenne **
Moyenne Vallée de l'Hérault								
Plaissan (alt. m)	3,7	7,5	11,4	-5,3	1-janv.	16,4	8-janv.	-0,2°C
Saint-André-de-Sangonis, Bourg* (alt. 88 m)	4,1	7,6	11	-5,3	4-janv.	15,3	8-janv.	-0,4°C
Saint-Jean-de-Fos (alt. 69 m)	3,1	7,3	11,6	-7,2	4-janv.	15,9	30-janv.	nc***
Montpelliérans								
Cournonsec - Fabrègues (alt. m)	3,5	7,6	11,8	-5,1	1-janv.	18	8-janv.	-0,3°C
Entre-vignes, bois de l'Hôpital (alt. 63 m)	3	7	11,1	-4,8	7-janv.	16,2	30-janv.	-0,6°C
Frontignan (alt. 31 m)	5	8,4	11,9	-3,2	1-janv.	18,1	8-janv.	-0,3°C
Marsillargues, mas de Carrière c.e.h.m (alt. 2 m)	-4	1,7	7,4	-4	1-janv.	7,4	1-janv.	
Mauguio, Montpellier aéroport* (alt. 2 m)	3,6	7,8	12	-5,8	6-janv.	16,9	8-janv.	-0,3°C
Montarnaud, Le Bois d'Arnaud* (alt. 142 m)	2,9	6,8	10,8	-5,7	1-janv.	16	8-janv.	-0,5°C
Montpellier, Château d'Ô (alt. 63 m)	3,5	7,6	11,6	-5,2	6-janv.	16,9	8-janv.	-0,9°C
Montpellier, Supagro (alt. 43 m)	3,6	7,5	11,5	-4,75	7-janv.	16,1 8	9-janv.	-1,0°C
Saint-Drézéry (alt. 75 m)	2,4	6,7	11,1	-8,1	7-janv.	16,1	30-janv.	-0,9°C
Sète, Sémaphore* (alt. 92 m)	6,2	8,7	11,1	-0,6	7-janv.	16,3	8-janv.	-0,2°C
Villeneuve-les-Maguelonne, domaine du Chapitre (alt. 2 m)	4,5	8,1	11,7	-3	7-janv.	16,3	8-janv.	-0,3°C
Nord Montpelliérans								
Moulès-et-Baucels, Les Oliviers* (alt. 234 m)	2,7	6,7	10,7	-6,9	5-janv.	15,4	30-janv.	nc***
Prades-le-Lez, Restinclières* (alt. 89 m)	1,6	6,5	11,5	-9,3	6-janv.	16,3	30-janv.	-0,4°C
Saint-Jean-de-Buèges (alt. 187 m)	3	6,9	10,7	-6,3	5-janv.	16,1	30-janv.	-0,7°C
Saint-Martin-de-Londres* (alt. 194 m)	1,9	6	10,1	-8,1	5-janv.	14,7	30-janv.	-0,4°C
Valflaunès, la Plaine (alt. 125 m)	2,3	6,7	11,1	-6,1	6-janv.	16,6	30-janv.	-0,1°C

* Stations météorologiques issues du réseau de Météo-France

** Moyenne 2011-2020 // **Ecart/Moyenne : voir symbolologie de "Classe écart et codes couleur"

nc*** : non communiqué

➤ Evapotranspiration potentielle

L'évapotranspiration est une composante essentielle du cycle de l'eau et du bilan hydrologique.

L'évapotranspiration potentielle, ou ETP, peut se définir comme la somme de la transpiration du couvert végétal et de l'évaporation du sol qui pourrait se produire en cas d'approvisionnement en eau suffisant. Plus simplement, L'ETP représente la demande en eau théorique dans des conditions de disponibilité en eau non limitante.

L'évapotranspiration potentielle peut être mesurée sur le terrain ou calculée à base de modèle. En agriculture, le modèle le plus souvent utilisé est celui de « Penman-Monteith » qui estime la couverture végétale comme un ensemble homogène.

L'ETP plein champ est proche de la moyenne avec un écart de -8%.

L'ETP Serre est identique à la moyenne avec un léger écart de +1%.

ETP (en mm) Janvier 2026	D1	D2	D3	Total	Ecart à la moyenne en %
ETP Plein Champ	19	10	12	41	-8
ETP Serre	13	6	11	30	1

ETP prévisible (en mm) Février 2026	D1	D2	D3	Total
ETP Plein Champ	16	18	15	49
ETP Serre	14	15	12	41

Sources : E.T.P. Penman Monteith en mm, Source Météo France, Moyenne 1976- 2005

Les données décennales sont extraites de la station Mauguio pour la période souhaitée.

Les données prévisibles sont en fait les moyennes établies sur une période de 30 ans (1976- 2005).

➤ Recharge pluviométrique hivernale


Les précipitations de janvier 2026 sont hétérogènes mais la recharge est presque hétérogène sur tout le département à quelques nuances près : elle évolue d'un excédent fort à très fort localement. Il faut souligner la légère variation entre Est (à tendance humide) et Ouest du département (à tendance très humide).

Vous pouvez donc visualiser ci-dessous, pour la période début septembre 2025 à fin janvier 2026, l'état de la recharge pluviométrique hivernale qui se traduit par des variations par rapport à la moyenne allant de 40% à 100%.

La pluviométrie participe à la recharge en eau des sols et des nappes phréatiques. Dans le département de l'Hérault soumis au climat méditerranéen, sols et plantes sont très dépendants des ressources en eau. Les périodes successives de sécheresse, intensifiées par le changement climatique, y sont d'autant plus préjudiciables. Dans ce contexte particulier, la recharge pluviométrique hivernale est donc primordiale et la période la plus favorable est l'automne-hiver.

Concernant l'automne-hiver 2025-2026, la recharge pluviométrique est caractérisée par rapport à la moyenne pluviométrique automne-hiver des mois de septembre 2025 à mars 2026 sur la période de référence 2011-2020.

Recharge pluviométrique hivernale par rapport à la moyenne de référence - Janvier 2026



Informations complémentaires

Les moyennes climatiques de référence des précipitations ou des températures permettent de caractériser le climat par rapport à des périodes plus ou moins longues servant de référence. Dans l'Hérault les moyennes sont calculées sur des périodes de 10 ans. Ainsi, pour chaque station, la moyenne de référence du mois en cours est calculée à partir des cumuls pluviométriques ou des températures moyennes des 10 mêmes mois de l'année couvrant la période 2011 et 2020.

La variation de la pluviométrie par rapport à la moyenne exprime une évolution à la hausse ou à

la baisse de la pluviométrie du mois par rapport à la moyenne de référence 2011-2020.

L'écart de température à la moyenne exprime la différence entre la valeur moyenne du mois et la moyenne de référence 2011-2020. Un écart négatif indique que la température moyenne du mois en cours est inférieure à la moyenne de référence, alors qu'un écart positif indique une température supérieure.

Sources des données

Les données de climatologie proviennent du réseau de 21 stations météorologiques départementales. Les données sont complétées par le réseau principal et complémentaire de Météo-France.

Classes de variation et couleurs associées pour la pluviométrie		
Classe de variation pluviométrique par rapport à la moyenne* de référence en %	Libellé	Couleur de la classe et dénomination en fonction de la saison
Variation inférieure à -75 %	Déficit extrême	Extrêmement sec
Variation entre -50 et -75 %	Déficit très fort	Très sec
Variation entre -30 et -50 %	Déficit fort	Sec
Variation entre -10 et -30 %	Déficit assez faible	Assez sec
Variation entre -10 et +10 %	Proche des moyennes	De saison
Variation entre +10 et +30 %	Excédent assez faible	Assez humide
Variation entre +30 et +50 %	Excédent fort	Humide
Variation entre +50 et +150 %	Excédent très fort	Très humide
Variation entre +150 et 300 %	Excédent extrême	Extrêmement humide
Variation supérieur à +300 %	Excédent exceptionnel	Exceptionnellement humide

Moyenne* : 2011-2020

Classes d'écart et couleurs associées pour les températures			
Classe d'écart de température à la moyenne* de référence en °C	Libellé	Couleur de la classe et dénomination en fonction de la saison	
		Automne Hiver	Printemps Été
Écart inférieur à -4 °C	Ecart à la baisse exceptionnel	Exceptionnellement froid	Exceptionnellement frais
Écart entre -3 et -4 °C	Ecart à la baisse extrême	Extrêmement froid	Extrêmement frais
Écart entre -2 et -3 °C	Ecart à la baisse très fort	Très froid	Très frais
Écart entre -1 et -2 °C	Ecart à la baisse fort	Froid	Frais
Écart entre -0,5 et -1 °C	Ecart à la baisse assez faible	Assez froid	Assez frais
Écart entre -0,5 et +0,5 °C	Proche des moyennes	De saison	
Écart entre +0,5 et +1 °C	Ecart à la hausse assez faible	Assez doux	Assez chaud
Écart entre +1 et +2 °C	Ecart à la hausse fort	Doux	Chaud
Écart entre +2 et +3 °C	Ecart à la hausse très fort	Très doux	Très chaud
Écart entre +3 et +4 °C	Ecart à la hausse extrême	Extrêmement doux	Extrêmement chaud
Écart supérieur à +4 °C	Ecart à la hausse exceptionnel	Exceptionnellement doux	Exceptionnellement chaud

Moyenne* : 2011-2020

Conditions d'accès aux données

Les données du réseau départemental et de Météo-France sont accessibles sous Licence Ouverte d'Etalab. Cette licence facilite la réutilisation libre et gratuite des informations publiques sous réserve de mentionner l'origine de la donnée :

- Département de l'Hérault
- Météo-France

Observatoire Départemental Climatologie Environnement Eau et Littoral odee.herault.fr

Conformément à la politique du Gouvernement en faveur de l'ouverture des données publiques, les données climatologiques du réseau départemental sont téléchargeables gratuitement sur le [portail de l'observatoire à la rubrique climatologie](#)



Observatoire Départemental Viticole odv.herault.fr



Sur le site de [l'Observatoire départemental viticole](#), vous trouverez des informations complémentaires sur les thématiques climatologie et pédologie